

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11-5-76018379

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F.

ET FRANCHE-COMTÉ - CÔTE-D'OR - SAÔNE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAÔNE - TERRITOIRE DE BELFORT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z. I. NORD - 21206 BEAUNE - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DUON 3405.12 K

7 Mai 1976

Bulletin n° 64 - Mai 1976

## V I G N E

A la faveur du relèvement des températures, et de quelques pluies locales, la croissance de la vigne est dans l'ensemble bien reprise. Le blocage de la végétation et le mauvais aspect du vignoble, particulièrement accusé sur Pinot, ont inquiété à juste titre les viticulteurs et peuvent être attribués à plusieurs causes :

- au froid exclusivement dans de nombreuses situations. La neige et le gel ont provoqué la crispation des feuilles terminales repliées vers le bas, des nécroses sur les nervures ; les feuilles de la base peuvent être "brûlées", mais les jeunes grappes ne semblent pas atteintes.
- à l'acariose (parfois avec érinose). Il est encore possible d'intervenir, de préférence avec un systémique, la température étant suffisante.
- aux araignées rouges (ou jaunes dans quelques cas) qui se concentrent sur les jeunes feuilles par temps froid. Une surveillance du vignoble s'impose et si la présence d'araignées est constatée sur plus de la moitié des feuilles, examinées de préférence à la loupe, il est nécessaire d'intervenir rapidement avec un acaricide. Les produits systémiques sont recommandés par températures suffisantes et pousse active : oxydéméton-méthyl : Meta Systémox R ; formothion : Anthio fort ; vamidothion : Kilval, Sepaphid, Systemac 400, Vamifène ; etc...

PYRALE : Rappel du dernier bulletin.

## ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : La végétation s'étant fortement développée depuis notre dernier avis et comme d'autre part de nouvelles taches viennent d'être découvertes dans les vergers négligés, il est nécessaire d'effectuer une prochaine application fongicide qu'il sera toutefois avantageux de retarder le plus possible. Cette protection devra être assurée nécessairement avant toute nouvelle période pluvieuse.

DIDYUM DU POMMIER : Eliminer et brûler les pousses oïdiées ; ajouter un anti-oïdium à la bouillie anti-tavelure.

PUCERONS ET CHENILLES DEFEUILLANTES : Surveillez les plantations et ajouter un aphicide ou un insecticide en cas de nécessité.

## ARBUSTES A PETITS FRUITS

DESSECHEMENT DES TIGES DU FRAMBOISIER : Un deuxième traitement est conseillé en visant la base des nouvelles pousses. La liste des fongicides à utiliser a été donnée dans notre bulletin n° 60 du 8 Avril.

## HOUBLON (Note n° 2)

MILDIU : Les pousses spiciformes doivent être détruites au fur et à mesure de leur apparition. Les conditions climatiques actuelles ne sont pas très favorables au développement du mildiou mais il convient de protéger préventivement les nouvelles pousses. Au début de végétation les applications fongicides doivent être suffisamment rapprochées pour assurer un bon état sanitaire dans les plantations.

## GRANDES CULTURES

CEREALES : Depuis la dernière décade d'avril, un réseau d'observateurs est mis en place avec le concours du S.U.A.D. et des organismes économiques. Actuellement ces agents sont chargés de surveiller les ravageurs des feuilles et les maladies, le piétin est le plus fréquemment cité ainsi que l'oïdium et parfois la septoriose.

Les Ingénieurs chargés  
des Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

P510